

Biricoccolos

Pollinisation : Ces arbres sont partiellement autofertiles mais ils produisent mieux si ils sont plantés proches d'un autre prunier, abricotier ou mieux : un autre Biricoccolo

Variété	fruit	Floraison (FR)	Récolte (FR, indicatif)	Caractéristiques du fruit
BlackForest (dit <i>Abricot noir</i>)		Floraison tardive avril / mai Compatible prunier « cuisse de none » (souvent après abricotiers standards → réduit risque de gel)	mi-juillet → mi-août	Fruits moyens à gros (40–60 g), peau presque noire/violacée , chair orangée à rougeâtre , très parfumée, goût mêlant abricot, prune et une pointe de fruits rouges ; texture juteuse, assez ferme ; bonne richesse en sucres , consommation fraîche et confiture
Nostrano (<i>Biricoccolo</i> ‘Nostrano’)		Floraison mi-saison Mars–avril (similaire abricot, parfois un peu plus tard)	début → mi-juillet	Fruits petits à moyens (25–35 g), peau rouge-orangée , chair dorée à rosée, sucrée et acidulée , très aromatique ; goût entre abricot et prune ; idéal en consommation fraîche, jus , et confitures parfumées
Spring Satin (<i>Plumcot / Plum-apricot hybrid</i>)		Floraison mi-saison mars à mi-avril	fin juin → début juillet (précoce, ±1 mois avant Nostrano)	Fruits moyens (40–50 g), peau rouge sombre presque noire , chair ambrée à rougeâtre , saveur très sucrée et riche , arôme complexe, très apprécié en dégustation ; texture juteuse, se consomme frais mais aussi pâtisserie et confiture
Vesuviano (<i>Biricoccolo</i> ‘Vesuviano’)		Floraison mi-saison Mars–avril (un peu plus tard que certains abricots)	mi-juillet → fin juillet	Fruits 30–40 g , ronds, peau rouge sombre à violacée , chair orangée ; goût sucré-aromatique , bien équilibré entre abricot et prune ; apprécié pour sa chair colorée , bonne aptitude en frais, confitures, séchage